

OFICIUL FITOSANITAR GORJ
Tgjiu.Bdul E.Teodoroiu nr.521

Nr. 50 / data 16 .01.2023

Tel.0253249043
dfggorj@yahoo.com
tel.0253 249043

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 1 din 16 .01.2023

Pentru prevenirea si raspandirea organismelor daunatoare agenti patogeni de sol si daunatori de sol in cultura :

SPATII PROTEJATE(,SERE SI SOLARII) PENTRU PRODUCEREA RASADURILOR DE LEGUME,LEGUME TIMPURII

1) Dezinfecția amestecului de pamant pentru producerea rasadului :

Pentru combaterea ciperilor de sol ,inainte de semanat cu 5-7 zile amestecul de pamant se va dezinfecta cu unul din produsele : **PREVICUR ENERGY = 0,1 %** (3 litri solutie /mp) sau **TRIUMPH 40 WG =0,3 %**.Se poate dezinfecta termic amestecul de pamant cu vapori de apa supraincalziti timp de o ora la 95-100 grade C la adancime 30-35 cm daunatorii mor instant.

2)Tratarea chimica a semintei : **PREVICUR ENERGY 2 ml/kg samanta.**

3)Dezinfectia solului si si a substratului de cultura destinat culturii de legume timpurii in spatii inchise
3)Tratament in vegetatie dupa rasarirea plantulelor pana la repicare pentru combaterea complexului de agenti patogeni de rasarire : putrezirea plantulelor (Pythium debaryanum),mana de sol (Phytophthora parasitica),putregaiul uscat al coletului (Rhizoctonia solani)



Pythium de barianum



Phytophthora parasitica

Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu ppp: **PREVICUR ENERGY =0,1 %** sau sau**MERPAN 80 WDG =0,15%(4-5 l solutie /mp)** sau

4) **Dezinfectia solului inainte de transplantarea rasadurilor in camp sau in spatii protejate** pentru complexul de patogeni de sol: mana de sol (Phytophthora parasitica),putregaiul uscat al coletului (Rhizoctonia solani),fuzarioza tomatelor (Fusarium spp.), caderea plantutelor (Phytium debaryanum),nematozii galicoli, se va folosi unul din produsele:

1) **BASAMID GRANULE =500 kg/ha (0,05 kg/mp)** aplicarea granulelor pe sol cu incorporare inainte de plantare; sau

2) **RAISAN 51 = 700 L/ha** aplicat prin udare inainte de plantare sau semanat

3) **NEMASOL TM 510** (fumigant de sol cu actiune nematocida ,fungicida ,erbicida ,insecticida =700-1200 l/ha(0,07-0,120 l/ mp)

Tratamentului solului ,in sistem de irigare cu picatura se va efectua ,cand in sol se inregistreaza o temperatura de 15 grade ,cu cel putin 21 de zile inainte de plantarea rasadului.

Pentru reducerea rezervei biologice de :musculita alba de sera (Trialeuroides vaporariorum) ,tripsul tutunului (Thrips tabaci),musca miniera (Liryomiza trifolli) ,omida capsulelor (Helicoverpa armigera) si alte insecte se recomanda aplicarea unuia din produsele :

VERTIMEC 1,8 EC = (0,08 - 0,1 %) sau MOSPILAN 20 SP = 0,025 % (GAZELLE a doua denumire comerciala) sau DELTAGRI = 0,4 l/ha

5) Pentru combaterea coropisnitei (Gryllotalpa gryllotalpa) si a melcilor fara cochilie :

META GOLD 3% (ARION PRO 3G) = 7 kg/ha (cu o usoara incorporare la coropisnita si fara incorporare la melci)

Cititi cu atentie prospectele produselor de protectia plantelor

Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune similara pentru agentii de daunare avertizati. Referinte : <http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html> - <https://aloe.anfd.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest si dati cautare in PEST-EXPERT. Folositi echipament de protectie (halat, ochelari, manusi, manusi) la manuirea produselor de protectia plantelor.

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin

ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M. Mediului, nr.15b/3404/1991 al

Departamentului pentru Administratie Locala, nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr.

127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, Legea nr.383/2013 a apiculturii completate

cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala

Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania -ROMAPIS (NR.103/21.10.2016 privind

implementarea Agentia Nationala Fitosanitară si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania,

privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu

ppp.

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr 297/2017 privind

aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a

plantelor. Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii

rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare

Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind

ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu

modificarile ulterioare.

Atentionare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie sa dețină dupa urmatorul model:

FERMIER (S.C., I.L., A.F.)-----

Sediul(adresa) -----

Ferma(sediul) -----

REGISTRUL PRIVIND EVIDENTA TRATAMENTELOR FITOSANITARE CU PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR


Data efectuării tratament. (ziua, Luna, Anul)	Cultura Şi locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. şi Data Documentului prin care s-a dat în consum populaţiei
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumire a Ppp folosit	Doza Omologată /doza folosită	Suprafaţa (ha)	Cantitatea Utilizată (kg, l.)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67(1))

Producatorul agricol numerează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului sau administratorului societăţii.

COORDONATOR
TATU ION

1 



RESPONSABIL PROGNOZA AVERTIZARE
UNGUREANU CONSTANTINA

