

OFICIUL FITOSANITAR GORJ

Tgjiu.Bdul E.Teodoroiu nr.521

NR. 73 /O/26.02.2024

Tel.0253249043
ofgorj@anf.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.2 data 26.01.2024

Pentru prevenirea și combaterea organismelor daunatoare în perioada repausului vegetativ, când condițiile meteorologice sunt prielnice: temperatura peste 5 grade Celsius, zile însorite, fără vânt, scoarta pomilor, arbuștilor (fructiferi sau ornamentali) a speciilor pomicele și dendrologice din pepiniere trebuie să fie uscată, fără chiciura și gheata se recomandă un tratament fitosanitar la următoarele grupe de plante sau culturi:

POMI FRUCTIFERI(SEMINTOASE –SAMBURIOASE), ARBUȘTI, PEPINIERE POMICELE ȘI DENDROLOGICE, VITA DE VIE

Pentru prevenirea și combaterea daunătorilor din rezerva biologică: paduchele din San Jose (*Quadraspidiotus perniciosus*), paduchele testos (*Parthenolecanium corni*), oua de afide (*Aphis* spp.), acarieni (*Tetranychus* și *Panonychus ulmi*), paduchele lanos (*Eriosoma lanigerum*), psylide se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe care a fost confirmată prezența acestora. Imediat după efectuarea lucrărilor de tăiere (rarire și fructificare) se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar prin imbaierea foarte bună a pomilor, arbuștilor și speciilor din pepiniere.

Pentru focul bacterian al rozaceelor boala produsă de ag.patogen (*Erwinia amylovora*) se face tăierea ramurilor cu simptom la circa 50 cm sub limita prezentei simptomelor, iar întregul material vegetal va fi strans și distrus prin ardere. Unele de lucru (foarfeci, fierăstrău) vor fi dezinfectate după fiecare utilizare cu soluție cuprică 3% sau hipoclorit de sodiu conc.1%.

Ulceratiile de pe trunchi vor fi înlăturate inclusiv o parte de 2 cm din țesutul ce înconjoară ulceratia și rana se dezinfectează cu 1% oxiclorigura de cupru- lucrare ce se face înainte de tăierile propriuzise din livada pentru a se evita răspandirea infecției la alte specii din jur. Se recomandă folosirea unuia din produsele de mai jos:

1) Tratament cu produse pe baza cuprice (stropirea albastră);

*CUPROFIX ULTRA (NOVICURE a doua denumire comercială)=6 kg/ha/la samburoase și 3,5-6 kg/ha la semintoase

*BOUILLIE BORDELAISE WDG (BORDOMIX a doua denumire comercială) = 0,5%

(5kg/ha samburoase și alte specii la 1000 litri apă și 7,5kg/ha la semintoase / 1500 litri apă) sau

* ALCUPRAL 50 PU =0,2% (2kg/ha/1000 L apă) și 0,3% semintoase (4,5 kg/ha/1500 l apă)

2) Tratamentul se aplică la 12-14 zile de la cel cu produse cuprice:

* JUVINAL 10EC =0,1% sau

*MOSPILAN 20 SP (KRIMA 20 SG a doua denumire)=0,450kg/ha + TOIL =0,5% adjuvant pr baza de ulei sau

*PLANTOIL (MIDOS OIL a doua denumire comercială)=0,75-1%(3,75-15 l/ha)

*OVIPRON TOP (VERNOIL a doua denumire comercială) =2500ml/100 litri apă sau 1500 ml /100litri apă în amestec cu insecticide

Puteti folosi și alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Măsuri alternative de combatere: mecanice; fizice; biologice;

Metode durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură un control corespunzător al organismelor daunătoare.

Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectia plantelor!

Luati masurile ce se impu pentru protectia mediului inconjurator!

Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune similara pentru agentii de daunare avertizati. Referinte : <http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://aloe.anfd.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest si dati cautare in PEST-EXPERT. Folositi echipament de protectie (halat, ochelari, manusi, manusi) la manuirea produselor de protectia plantelor.

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin **ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala, nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania -ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016 privind implementarea Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania, privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp. Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltatii rurale nr 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor. Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania ,cu modificarile ulterioare.**

Atentionare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie sa dețină dupa urmatorul model:

FERMIER (S.C., I.I., A.F.)-----

Sediul(adresa) -----

Ferma(sediul) -----

REGISTRUL PRIVIND EVIDENTA TRATAMENTELOR FITOSANITARE CU PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament Semnatura	Data inceperii Recoltarii produsului agricol	Nr. si Data Documen tului prin care s-a dat in consum populației ei
			Agentul de daunare :	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologata /doza folosita	Supra-fata (ha)	Cant it. Utili - zate (kg,l .)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67(1))

Producatorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționeaza cate pagini conține registrul, purtand semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății .

COORDONATOR
CROITORU DORIN CATALIN



RESPONSABIL PROGNOZA AVERTIZARE
UNGUREANU CONSTANTINA