



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE  
AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA  
OFICIUL FITOSANITAR GORJ

Bd. Ec. Teodorou, nr. 521  
Iglia, Jud. Gorj  
Nr. 231 O 03.04.2019

tel: 0253249043  
fax: 0253249043  
e-mail: ofgorj@anf.ro



**BULETIN DE AVERTIZARE**

**Nr. 11 din 03.04.2019**  
**„ A preveni este mai simplu decat a vindeca”**

Conditiiile climatice din ultimele zile pot favoriza aparitia si dezvoltarea buruienilor care pot cauza pierderi importante la urmatoarele culturi de cereale paioase:

**GRAU, ORZ, ORZOAICA, OVAZ SI TRITICALE**

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii: infestarea culturii cu buruieni mono si dicotiledonate anuale si perene. Pentru efectuarea tratamentului, folositi unul din produsele de protectie a plantelor -erbicide, dupa caz:

- RIVAL SUPER STAR75 GD =15- 20 g /ha sau
- RIVAL STAR 75 GD (FRONTAL 75 GD) =15-20 g/ha (grau,ovaz ,triticale)si 10-15 g /ha (orz si orzoaica) sau
- DICOPUR TOP 464 SL (CEREDIN FORTE 464 SL) =0,8 - 1 l/ ha sau
- DICOPUR M = 1 l/ha sau
- ATLANTIS FLEX = 0,2 l/ha -0,33 l/ha(in functie de gradul de imburuienare si buruienile rezistente-(iar) vantului ,odos ,coada vulpii,musetel se va da doza maxima) sau
- PRIM STAR SUPER =10 g/ha sau
- GRANSTAR SUPER 50 SG (CAMEO MAX) = 40 g /ha cand e deficit hidric se aplica adjuvant TREND doza 250 ml /ha se aplica de la infratit pana la aparitia frunzei stindard iar apa se vafolosi 500 l/ ha ) sau
- PREMIANT (TELLURIUM) =0,8 -1 l/ha sau
- MUSTANG(VECTOR) =0,4-0,6 l/ha sau
- HELMSTAR 75 WG =10-20 g /ha (15-20 g/ha la grau ,triticale- si 10 -15 g/ha la orz)

Perioada optimă de tratament: infratire paioaselor pana la formarea primului internod si altele pana la aparitia frunzei stindard iar palamida sa nu depaseasca 10 -15 cm inaltime.  
Cantitatea de apa folosita la hectar variaza intre 200-400 l .

**\*SE VA RESPECTA CU STRICTETE PERIOADA DE ERBICIDARE RECOMANDATA A PRODUSULUI FOLOSIT**  
*Erbicidele RIVAL STAR SI RIVAL SUPER STAR pot fi aplicate pana la sfarsitul de vara, dar eficacitatea e mai redusa.*  
 Se vor folosi numai produse de protectia plantelor omologate.

Cititi cu atentie prospectele produselor de protectia plantelor inainte de utilizare.

Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune similara pentru agentii de daunare avertizati. Referinte: [http://www.madr.ro/ro\\_fitosanitar.html](http://www.madr.ro/ro_fitosanitar.html)-<https://alde.anfd.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest si dati cautare in PEST-EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat, ochelari, manusi, manusi ) la manuirea produselor de protectia plantelor.

Nu deversati solutiile de stropit pe sol, langa cursuri de apa, canale de scurgere, suprafete de beton. Aplicati tratamentul in conditii favorabile fara vant si ploaie cu temperaturi pozitive peste 8-10 grade Celsius. Clatiti de 3 ori recipientele si livrati ambalajele la operatorii economici care efectueaza neutralizarea acestora <program SCAPA>  
 >accesati [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro).

Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatarele agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara. Referinte: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.”Se vor respecta cu strictete cerintele de agromediu, clima, sol si silvomediu conform normelor Programului de Dezvoltare Rurala masurile(M10,M11,M13,M15).

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp, depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin **ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, Ord. nr. 68/1992 al M.Mediului, Ord. 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala, Ord. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si Ord. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania –ROMAPIS (nr.103 /21.10.2016` privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.**

**Atentionare!**

**Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie sa dețină :**

**REGISTRUL PRIVIND EVIDENTA TRATAMENTELOR FITOSANITARE DUPA URMATORUL MODEL.**

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. si Data Documentului prin care s-a dat in consum populației
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologata doza folo-sita	Su-pra-fata (ha)	Cantit. Utili-zate (kg,l.)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009, art. 67(1))

Producatorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționează câte pagini conține registrul purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

INTOCMIT

Ing. UNGUREANU CONSTANTINA

