




MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE  
AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA  
OFICIUL FITOSANITAR GORJ



Bd. E. Teodoroiu, nr. 521  
Tg Jiu, Jud. Gorj  
Nr. 245 / OF 09. 04. 2019

tel: 0253249043  
fax :0253249043  
e-mail- ofgorj@anf.ro



**BULETIN DE AVERTIZARE**

Nr.13 din 09.04.2019

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca “

Conditiiile climatice din ultimele zile pot favoriza aparitia si dezvoltarea bolilor si daunatorilor care pot cauza pierderi importante la :

**CAPSUN**

**Boli :**patarea alba produsa de (*Mycosphaerella fragariae*); putregaiul coletului produsa de(*Phytophthora cactorum*,arsura bacteriana (*Xanthomonas fragariae* ),mana capsunului produsa de (*Phytophthora fragariae* ).

**Daunatori:**gargarita neagra a capsunului (*Anthonomus rubi* ),paianjenul capsunului (*Tarsonemus fragariae* ) ,paianjenul rosu (*Tetranychus urticae* ),tripsi.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii :

**-boli infectie primara si prezenta daunatorilor**

Se recomanda folosirea unuia din produsele sau amestecurile de mai jos :

- CIDELY TOP =1 l/ha + MAVRIK 2F =0,05% sau
  - CUPROFIX ULTRA =1,5 – 2kg/HA +VERTIMEC 1,8 EC =1-1,2 l/ha sau
  - ORTIVA TOP =1 L /ha + CALYPSO 480 SC =0,02 %s sau
  - TOPSIN 70 WDG =0,07 % + MAVRIK 2 F = 0,05% sau
  - CHORUS 75 WG = 0,03% +CALYPSO 480 SC =0.02%
- (0,3 kg produs comercial. /ha)

**Perioada optima de tratament :** inainte de inflorit –buton alb si aplicati alt tratament la o noua infectie -.dupa inflorit

La prezenta acarienilor trebuie sa aplicati un acaricid :FLORAMITE 240 SC=0,4-0,6 litri/ha sau MILBEKNOCK EC=0,05%.(FLORAMITE netoxic pentru albine cu timp de pauza 1 zi.

Canitatea de solutie folosita =1000 L/HA.Respectati timpul de pauza pentru fiecare produs.

*Masurile de igiena culturala au mare importanta in prevenirea celor mai periculoase boli din cultura :folosirea de stoloni sanatosi ,rotatia culturii ,eliminarea resturilor vegetale fertilizarea echilibrata cu ingrasaminte complexe .*

Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune similara pentru agentii de daunare avertizati.Referinte :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://aleo.anfd.ro>, open tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest si dati cautare in PEST-EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi,masca) la manuirea produselor de protectia plantelor.

. Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa. respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatarele agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara. Referinte:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.”

**Respectarea normelor de eco conditionalitate prevazute in Ordinul 352 din 10 feb/2015 conform caruia fiecare fermier care solicita plati in cadrul schemelor si masurilor de sprijin trebuie sa respecte cerintele cu privire la utilizarea ppp (SMR 10 )**

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin **ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala,nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania –ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016 privind implementarea Agentia Nationala Fitosanitară și Asociatia Crescatorilor de Albine din România, privind implementarea legislatiei, în vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.**

**Atentionare!**

**Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să dețină:**

**Registrul privind evidenta tratamentelor fitosanitare după următorul model:**

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data inceperii Recoltării produsului agricol	Nr. si Data Documentului prin care s-a dat in consum populației
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori i/ buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omo- logata /doza folo- sita	Su- - pr a- fat a (h a)	Cantit. Utili- zate (kg,l.)			

(Comform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1) )

Producatorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționează cate pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății .

INTOCMIT

ING. UNGUREANU CONSTANTINA