



romania2019.eu

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
 OFICIUL FITOSANITAR GORJ

PRIMĂRIA COM. PEȘTIȘAN.
 Jud. Gorj 3833
 INTRARE Nr. 09
 IESIRE Nr. 09
 Zilua Luna Anul 2019

Bd. E. Teodorescu nr. 571

tel: 0253249043

Țy. Na. Juc. C06

fax: 0253249043

Nr. 266/O 17.04. 2019

e-mail: ofgorj@anf.ro



BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 15 din 17. 04. 2019

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca ”

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunatorilor care pot cauza pierderi importante în pomicultura la speciile din grupa :

SAMBUROASE (PIERSIC, CAIS, CIRES ,VISIN etc.)

Boli : monilioza produsa de ag.patogen (–*Monilinia* spp.), ciuruirea produsa de agentul patogen – (*Coryneum b.*), patarea rosie produsa de agentul patogen (–*Polystigma rubrum*), basicarea frunzelor de piersic produsa de agentul patogen (–*Taphrina deformans*)

Daunatori : viespea prunelor (*Hoplocampa* spp.), omizi defoliatoare-cotarul brun (*Operopthera brumata*) și cotarul verde (*Erannis defoliaria*)

Pentru prevenire și combatere se recomandă se recomandă executarea tratamentului I la *Hoplocampa* spp. după criteriul biologic în perioada preovipozită (depunerea primelor ouă la baza caliciului floral) numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții :

-boli infectie secundara și prezenta daunatorilor

Se recomandă folosirea unuia din produsele sau amestecurile de mai jos :

- BOUILLIE BORDELAISE WDG =0,5%(5 kg /ha) + CALYPSO 480 SC =0,02% sau
- SIGNUM =0,05 % + FASTAC 10 EC =0,02% sau
- TOPSIN 70 WDG =0,07 %(0,7 kg /ha) + MAVRIK 2 =0,05% (0,5 l/ha în 1000 l apa) sau
- SCORE 250 EC = 0,02 % + DELTAGRI =0,025-0,3 l/ha sau
- DITHANE NEOTEC 75 WG = 0,2 % + FASTAC 10 EC =0,02% sau
- LUNA EXPERIENCE 400SC =0,5 l/ha + KARATE ZEON =0-,015 %

Perioada optimă de tratament: după criteriul fenologic atunci când 15 % din petale s-au scuturat iar tratamentul al II-lea la 8-10 zile de la primul tratament. Având în vedere faptul că până la completa dezvoltare larva migrează în 2-3 fructe și de aceea e necesar tratamentul al II-lea.

Citiți cu atenție prospectele produselor de protecția plantelor înainte de utilizare .

Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune similara pentru agentii de daunare avertizati.Referinte :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://www.anfd.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest si dati cautare in PEST-EXPERT. Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi,manusi) la manuirea produselor de protectia plantelor.

Nu deversati solutiile de stropit pe sol langa cursuri de apa sau canale de scurgere suprafețe de beton.Cantitatea de solutie la ha este de 1000 litri si aplicati tratamentul in conditii favorabile fara vant si ploaie.Ciatiți de 3 ori recipientele si livrati ambalajele la operatorii economici care efectueaza neutralizarea acestora <program SCAPA >[accesati www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro). Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatarele agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp„ elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara, Referinte:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionabilitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.”Se vor respecta cu strictete cerintele de agromediu,clima ,sol si silvomediu conform normelor Programului de Dezvoltare Rurala -masurile(M10,M11,M13,M15).

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA,Ord. nr. 68/1992 al M.Mediului, Ord. 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala,Ord. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si Ord. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania -ROMAPIS (nr.103 /21.10.2016 ` privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.

Atentionare!

**Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie sa dețină :
REGISTRUL PRIVIND EVIDENTA TRATAMENTELOR FITOSANITARE DUPA URMATORUL MODEL.**

Data efectuării tratamentului (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. și Data Documentului prin care s-a dat în consum populație
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologata /doza folosita	Suprafața (ha)	Cantitate Utilizate (kg.l.)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numerează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

INTOCMIT

Ing.UNGUREANU CONSTANTINA